






# INFORMACIÓN TÉCNICA VACUNAS CONTRA SARS-COV-2

División de Prevención y Control de Enfermedades  
Departamento de Inmunizaciones  
Subsecretaría de Salud Pública




22 de diciembre 2021



## INFORMACIÓN TÉCNICA VACUNAS CONTRA SARS-COV-2

NOMBRE COMERCIAL	BNT162b2		CoronaVac		ChAdOx1-S / AZD1222
LABORATORIO	Pfizer-BioNTech		Sinovac		AstraZeneca
IMAGEN	Pedriátrica	Adulto	Monodosis	Multidosis	
					
DISPONIBILIDAD EN VACUNATORIOS	No disponible	Disponible	Disponible		Disponible
PLATAFORMA	ARNm (mensajero)		Virus inactivado		Vector viral (Ad - Chimpancé)
INDICACIÓN	De 5 a 11 años	A partir de los 12 años	A partir de los 3 años		Hombres: a partir de los 45 años Mujeres: a partir de los 55 años
ESQUEMA	2 dosis: 0 y 28 días		2 dosis: 0 y 28 días		2 dosis: 0 y 28 días
DOSIS	0,2 mL (10 mcg)	0,3 mL (30 mcg)	0,5 mL		0,5 mL
FORMA FARMACÉUTICA	Suspensión inyectable en vial multidosis (10 dosis)	Suspensión inyectable en vial multidosis (6 dosis)	Suspensión inyectable en vial monodosis y multidosis (2 dosis)		Suspensión inyectable en vial multidosis (10 dosis)
TÉCNICA DE PREPARACIÓN	Diluir la vacuna con 1,3 mL de cloruro de sodio al 0,9%. Limpiar el tapón del vial de la vacuna con antiséptico, durante la dilución y preparación.	Diluir la vacuna con 1,8 mL de cloruro de sodio al 0,9%. Limpiar el tapón del vial de la vacuna con antiséptico, durante la dilución y preparación.	Extracción de la totalidad del contenido del vial monodosis o extraer del vial multidosis, la dosis indicada (0,5 mL)		Extraer del vial multidosis la cantidad indicada (0,5 mL)
DURACIÓN FRASCO ABIERTO	12 horas desde su dilución	6 horas desde su dilución	Administrar inmediatamente después de abierta	Administrar 6 horas desde su apertura	6 horas desde su apertura, a temperatura ambiente hasta 30°C 48 horas desde su apertura, refrigerado entre +2 a +8°C
APARIENCIA	Suspensión de color blanco a blanquecino	Suspensión de color blanquecino	Suspensión opalescente o blanco lechoso		Suspensión clara a ligeramente opaca, incolora a ligeramente marrón
VÍA DE ADMINISTRACIÓN	Intramuscular		Intramuscular		Intramuscular
ALMACENAMIENTO	Almacenar entre -90 a -60°C a nivel central y para su administración a nivel ejecutor, conservar en temperaturas entre +2 a +8°C por 10 semanas (70 días).	Almacenar entre -90 a -60°C a nivel central y para su administración a nivel ejecutor, conservar en temperaturas entre +2 a +8°C por 31 días.	Mantener entre +2 a +8°C. No congelar. Almacenar en el empaque original para protegerlo de la luz.		Mantener entre +2 a +8°C. No congelar. Almacenar en el empaque original para protegerlo de la luz.
CONTRAINDICACIÓN	Antecedentes conocidos de una reacción alérgica grave (ej., anafilaxia) a algún componente de la vacuna		Antecedentes conocidos de alergia a algún componente de la vacuna		Antecedentes conocidos de reacción alérgica grave (ej., anafilaxia) a algún componente de esta vacuna.

## INFORMACIÓN TÉCNICA VACUNAS CONTRA SARS-COV-2

NOMBRE COMERCIAL	Convidecia / Ad5-nCoV	Ad26.COV2.S	Sputnik-V
LABORATORIO	CanSino	Janssen (Johnson & Johnson)	Instituto Gamaleya
IMAGEN			
DISPONIBILIDAD EN VACUNATORIOS	Disponible	Disponible	Disponible
PLATAFORMA	Vector viral (Ad - Humano 5)	Vector viral (Ad - Humano 26)	Vector viral en 2 componentes (Ad - Humano 26 y Ad - Humano 5)
INDICACIÓN	Entre los 18 y 60 años	A partir de los 18 años	A partir de los 18 años
ESQUEMA	1 dosis	1 dosis	2 dosis: 0 y 21 días Primera dosis: Ad - 26 Segunda dosis: Ad - 5
DOSIS	0,5 mL	0,5 mL	0,5 mL
FORMA FARMACÉUTICA	Suspensión inyectable en vial monodosis	Suspensión inyectable en vial multidosis (5 dosis)	Suspensión inyectable en vial multidosis (5 dosis)
TÉCNICA DE PREPARACIÓN	Extracción de la totalidad del contenido del vial	Extraer del vial multidosis la dosis indicada (0,5 mL)	Extraer del vial multidosis la dosis indicada (0,5 mL)
DURACIÓN FRASCO ABIERTO	Administrar inmediatamente después de abierta	6 horas desde su apertura	Administrar inmediatamente después de abierta
APARIENCIA	Suspensión incolora o ligeramente blanca	Suspensión incolora a ligeramente amarilla, entre transparente y muy opalescente	La solución congelada es una masa blanquecina densa, endurecida. Descongelada, es una solución homogénea incolora o amarillenta ligeramente opalescente
VÍA DE ADMINISTRACIÓN	Intramuscular	Intramuscular	Intramuscular
ALMACENAMIENTO	Mantener entre +2 a +8°C	Mantener entre +2 a +8°C. Almacenar en el empaque original para protegerlo de la luz	Mantener a -18°C o menor. Almacenar en el empaque original para protegerlo de la luz
CONTRAINDICACIÓN	Antecedentes conocidos de alergia a algún componente de la vacuna	- Antecedentes conocidos de alergia a algún componente de la vacuna. - Personas que han presentado previamente episodios de síndrome de fuga o extravasación capilar (SFC).	- Antecedentes de hipersensibilidad a algún componente de la vacuna. - Antecedente de reacciones alérgicas graves (anafilaxia). - Enfermedades agudas graves o exacerbación de enfermedades crónicas.



 **PLAN DE ACCIÓN**  
**CORONAVIRUS**  
COVID-19